



بیماری سرخرگی پیرامونی یا همان P.A.D چیست و چگونه بر روی پای شما تاثیر می گذارد



سرخرگ سالم



- آزمایش خون برای اندازه گیری مقدار چربی و کلسترول خون ، قند و نشخیص دیابت

نظر پزشکتان

- پرهیز از هوای سرد و گرم
- نگاهداشت آندامها
- پرهیز کردن از بعضی داروهای سرماخوردگی که میتواند باعث منقبض شدن رگها شود
- مواخت و توجه زیاد از پاهایتان
- اجتناب از پا برخنه رفتن
- کفش‌های مناسب که تنگ نیستند
- بهداشت و نظافت پاها و انگشتان
- تحت نظر دکتر متخصص با بودن
- تحت نظر دکتر عروق ، داخلی ، دیابت و دیگر دکترانی بودن که ریسک فاکتورهای آن را میتواند کنترل کنند
- برای شما آرزوی بهبودی و تندرنستی می کنم
- با سپاس فراوان پایینده ایران

درمان آن چگونه است:

- استفاده از دارو برای کم کردن چربی و کلسترول ، کنترل دیابت و فشار خون ، وسایع شدن از انعقاد خون با استفاده از داروهایی چون آسپرین یا پلاویکس . همچنین استفاده از دارو برای گشاد کردن رگها مانند **pletal** و یا با بیشتر کردن انعطاف سلولهای خون که آساتراز مویرگها عبور کنند مانند **trental**.
- در مواردی که این بیماری پیشرفته باشد با (جراحی اعوض کردن رگها) و یا آنجیوپلاستی (استفاده از بالون و توپی) و یا سیمهای که در انتهای آن مته ای است و گرفتگی چربی را باز میکنند.
- این بیماری کاست:
- دخانیات مصرف نکنید
- غذای خود را سالمتر کنید ، سبیحات بیشتر و چربی کمتر
- مراجعت به پزشک و استفاده از داروهای تجویز شده
- ورزش‌های مخصوص تحت

دکتر مجید سیدیان، جراح و متخصص پا

(دارای لوح رئیسی در سندات زیر اینجا را پیشتر نهاده این بیماری را در هنگام شدید

پای شده قلب دوم شداست



- ◆ در مدت شدید پای نایاب از اندامات و نگهداری
- ◆ پرآمدی و کمی انتکشان پا
- ◆ ساق کتف پا
- ◆ نوبه رطیه های دیابتی، عروقی و نوروس پا
- ◆ درد پائمه و دردهای تند و عیسی پا
- ◆ فرو رفته و گوش ناخ انکشان پا
- ◆ درمان ناخ های فارچی با استفاده از تزر
- ◆ غشک پوت، موژن، خارش، لیتی
- ◆ سردی و داغی مزمن پا
- ◆ درمان زیل، پیمه، و معجه های پا
- ◆ کشمکشی دیابتی و نوتکشمکشی علی
- ◆ تزریم، تقویض مصل های پایا پیشرفت ترقی روشی های علی

نشانی مطب: جنب رستوران نادری در انسینو

818-654-8360

17777 Ventura Blvd., #252 Encino, CA 91316

چه کسانی در ریسک

بیشتری هستند؟

۱- افراد بالاتر از ۷۰ سال

۲- افراد بالاتر از ۵۰ سال که سابقه دیابت و سیگار

کشیدن دارند

۳- افراد بالاتر از ۵۰ سال که دارای

ریسکهای دیگری

جون چاقی ، و فشار

خون بالا هستند

۴- عوامل

دیگری چون حوادث ، اشعه ، نورم رگها ،

ولی این عوامل بندرت موجب این بیماری

میشوند.

ریسک فاکتورهای این بیماری به ترتیب

ذیل میباشد :

۱- استفاده از دخانیات

۲- دیابت

۳- چاقی (BMI بیشتر از ۳۰)

۴- فشار خون ۱۴۰/۹۰ با بالاتر

۵- کلسترول بالاتر از ۲۴۰mg/dl

۶- بالارفتن سن (مخصوصا بالاتر

۷- ساقه خانوادگی در امراض قلبی و

امراض عروقی (رگی)

۸- بالا بودن پرتوین به نام همو

سیستاین

افرادی که دیابت دارند و هم زمان از

دخانیات استفاده میکنند در بالاترین

ریسک میباشدند. باید اینجا یکویم که

سردی وی حسی یاد داد و علامت پیشین که

گفته شد ممکن است دلایل دیگری هم

داشته باشد و بهتر است تحت نظر دکترتان

به ریشه آن بپرید.

چگونه پی بردن به این

بیماری :

پیشکشان با پرسیدن سوالهایی همچون

چگونگی عوارض این بیماری ، شدت و

مدت زمان آن ، ریسک فاکتورهایی که قبل از

ذکر گردیده و همچنین بی بودن به علامت آن

مانند سردی ، رنگ پریدگی ، سوخت

برگشت خون به سطح پوست اندکستان که

به آن Capillary Fill Time یا زمان پر

شدن مویرگها میگویند میتوانند به این

بیماری مظنون شوند و برای بی بودن قطعی

آن آزمایش‌های زیر را انجام دادن :

Ankle brachial index

در این آزمایش فشار خون در بازو و معچ پای

شما بهمراه دستگاه دایلو اندازه گیری

شده و بهم تقسیم میشوند. عدد بدست

آورده را با جدولی مقایسه می کنند تا به

شدت بیماری بپرند.

- آزمایش آلتروسوند (Dopplers Ultrasound)

- آنجیوگرافی : در این آزمایش در

داخل رگها رنگی تزریق میشود و درزیر

دستگاه ایکس ری عکس برداری

CTA یا MRA شما را پیدا میکنند که بصورت مناطقی

باریک شده در رگها پدیدار میگردند.

دوستان میتوانند

تمامی ویدئوهای برنامهای علمی

تلویزیونهای مرا

در سایت کامپیوتری

hollywoodfootclinic.com

بینند

با درود فراوان خدمت هم میهنان گرامی :

بار دیگر خوشبختی آن را یافتم تا چند

سخنی در باب مشکلات پا با شما در میان

بگذارم ، باشد که خدمتی هر چند ناچیز

کردیم از بیماریهای نقرس ، دیابت ، آرتروس

و انواع تورمیهای پا . امروز میخواستم در

مورد بیماری P.A.D یا همان

Peripheral Arterial Disease

که در فارسی می توان به آن بیماری

سرخرگی پیرامونی گفت . در این بیماری در

سرخرگهای اندامهای پا و دست گرفتگی

ایجاد شده که جریان خون را کند و یا در

بعضی موارد مسدود میکند . این بیماری

بخصوص در اندامهای پایینی (لگن ، ران ،

زانو ، ساق پا ، معچ پا ، و انگشتان پا) دیده

شده که موجب سردی ، درد و خستگی در

هنگام راه رفتن میگردد . این بیماری

میتواند گویای بیماری عروقی بزرگتر

جمع شدن چربی در عروق مهم ، و کم

رسانی خون به اندامهای حیاطی تر مانند

قلب و یا مغز باشد . همانند سایر بیماریهای

دیگر تشخیص هر چه زودتر آن شناس

درمان و کنترل آن را به مراتب بیشتر

مسازد . عوارض این بیماری بستگی به

پیشرفت آن دارد و شامل سردی اندکستان

درد و خستگی و گرفتگی عضلات

مخصوصا در هنگام راه رفتن میباشد . اگر

احساس میکنید که اندکستان مانند مژمن (طولانی) دارد حتی در زمانی که هوا

سرد نیست و یا دچار خستگی و درد و

گرفتگی در عضلات پا ، بخصوص ساق پا

میشوید پس از کمی راه رفتن و یا از پله بالا

رفتن ، بهتر است با یزشک خود صحبت

کنید .

عوارض این بیماری را میتوان چنین

ذکر کرد :

- خستگی ، درد و گرفتگی

عضلات در ناحیه ساق پا ، ران و لگن

- خواب رفتگی و بی حسی پا

- زخم‌هایی که در پاها و

انگشتان التیام نمی یابد

- رنگ پریدگی پوست پا و ساق

- براق شدن پوست پا و ساق پا

- کم شدن رشد ناخنها پا

- کم شدن یا نبودن ضربان

سرخرگهای پا

این عوارض میتواند در یکی از اندام پا

بیشتر از دیگری باشد . در سوارد پیشرفتنه

این بیماری ، درد میتواند در ه